

布鲁氏菌病简称布病，是由布鲁氏菌引起的一种人畜共患传染病，俗称懒汉病，是布鲁氏菌所引起的动物源性传染病。布病严重危害人民身心健康和畜牧业发展，是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，也是《职业病目录》规定的生物因素所致的职业病。



如何会患布病呢?



布病是如何传播的?

目前已知有60多种家禽、家畜和野生动物是布鲁氏菌的宿主，与人类有关的主要是羊、牛和猪。染菌动物首先在同种动物间传播，造成带菌或发病，随后可通过皮肤黏膜

接触、消化道、呼吸道等途径传播给人类。人群对布病普遍易感，牲畜养殖、畜产品生产加工、动物防疫和布病防治工作人员等是其高危人群。



得了布病有哪些临床表现?

布病的潜伏期为1-3周，长至数月，平均两周。临床上分为隐性感染、急性感染、亚急性感染和慢性感染。隐性感染不表现任何临床症状和体征。急性和亚急性感染多表现为发热、多汗（见于夜间或凌晨）、游走型大关节疼痛、乏力，体检可发现肝、脾和淋巴结大。慢性感染症状不明显、不典型且表现多样，主要为疲劳、全身不适、精神抑郁等。病例症状出现后1月以内，经正规、足疗程的治疗是可以治愈的。

如何预防布病呢?



01 养殖户如何预防布鲁氏菌病

饲养家畜要圈养。避开水源。不得散放、串街、混放。人畜分居，无论是成畜还是幼畜，都不要放入室内饲养。饲养过牲畜的场所应进行消毒。特别是出现牲畜流产时，一定要避免直接接触流产物和死胎，应立即对其进行彻底消毒处理。注意个人卫生防护。进行照料牲畜、清洁圈舍等劳动时，要佩戴手套、口罩等防护用品，劳动后要彻底清洗。



02 家庭如何预防布鲁氏菌病

注意饮食、饮水卫生。不吃不清洁的食物，饭前洗手，不喝生水。特别是肉、奶等畜产品，食用前一定要充分加热，不可食用生肉、生奶等。家庭用的菜刀、菜案，要生熟分开；切了生肉的刀、案，也要用热水消毒，避免污染其它餐具。



03 如何防止经皮肤黏膜感染布鲁氏菌病

接羔助产和处理流产胎儿、死羔时应做好个人防护，除备有工作服、橡皮围裙、帽子、口罩和胶鞋外，还应戴乳胶手套和线手套，备有接羔袋和消毒液，严禁赤手抓拿流产物。剪毛、收购、保管、搬运和加工皮毛的人员，工作时应做好个人防护，不要赤手接触皮毛，工作后要洗手，洗脸和洗澡，工作场地应及时清扫，消毒。皮肤、手如有刮伤，破损，要及时消毒、包扎。



布病防控歌

布氏菌，危害大，人畜共患让人怕
人感染，症状明，热汗乏力关节疼
早发现，早诊断，早期治疗很关键
若贻误，转慢性，无法劳动懒汉病
传染源，是家畜，奶羊肉羊牛狗猪
病死畜，流产物，生肉内脏生鲜乳
传染人，靠粘膜，直接接触易传播
消化道，呼吸道，三条途径要明了
养殖户，屠宰工，皮毛乳肉带加工
职业病，青壮年，春夏季节易感染



布鲁氏菌病 防控科普知识