

结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)

这种提取的物
核质试验结果恒定,更准
非特异性反应。它是帮助医生来判断您
孩的依据,但不是唯一依据。诊断肺结核
和影像学检查的结果。

士会取0.1ml液体PPD,在您的左前臂屈
射后72小时后测量皮肤硬结的横
支肤硬结直径小于5毫米为阴性;硬结直
之间为弱阳性;硬结直径在10-19毫米
阳性;硬结直径大于20毫米或虽小
部出现水泡、坏死者为强阳性。

金结果的临床意义:
①阳性:一般仅表示
过结核感染或已接种过卡介苗,并不一
病。
②强阳性:常表示体内有活动性结核

病;3岁以下,尤其是1岁以下未接种卡介苗
核质试验呈阳性反应时,则表示体内有新
生的可能性越大。

表示受试者未受过结核感染。但下列情
阴性结果:a、初次感染结核菌4-8周内,由
态反应尚未建立;b、机体免疫功能低下或
时,如严重营养不良,重症结核,肿瘤,艾滋病,
咳,猩红热,重度脱水,重度水肿等,也可呈假
c、使用糖皮质激素,免疫抑制剂者结核菌素试验
呈阴性反应;d、一些老年人结核菌素试验
性反应。

注意事项:当日做完皮试后如出现:
等局部症状,请勿抓挠。尽量避免见水,
断结果。

武汉市



CCG名称的由来?

答:婴儿接种后,在同侧腋窝偶尔会有淋巴结肿大的现象,于1921年
种减毒的活性牛型结核杆菌疫苗,于1921年
neite)及介医生(Guerin)所研制成功的疫苗,
的伟大贡献,所以就将预防结核病的疫苗称为
ite Guerin,简称BCG)(Bacilli杆菌)。

接种卡介苗?

答:接种卡介苗可以使人体产生对结核病的
疗,接种卡介苗可以使人产生对结核病的
病(俗称肺痨)。婴幼儿的抵抗力最弱,若受到
易发生急、重症结核病,如结核性脑膜炎、血
病,因此每一个婴儿都一定要接种卡介
苗。

后什么时候可以接种卡介苗?

答:体重在2500克以上的婴儿,出生24小时内即
在1周岁前完成接种。

什么时候接种卡介苗比较好?

答:(1)传染病来源,早产儿最好在出生六个月后再
半年内体重已经超过2500克,经医生检查发育
正常,应等症状消失后经医师检查已完全恢复
时接种卡介苗为宜?

答:在接种卡介苗后若无淋巴结肿大,请到结核病防治所就诊,医
生根据需要给予用药,必要时可外科手术治疗。

什么情况不可以接种卡介苗?

答:(1)疑似结核病及疑似结核菌感染的人,应先经结核菌素测
验,确定没有被结核菌感染,才可接种卡介苗。(2)罹患急性病、发烧、

问题7:接种卡介苗后,局部会有什么反应?

答:接种卡介苗后约一至二周,局部会呈现红色小节结,以
后逐渐增大,微有痛痒,但不会发烧;六至八周会形成脓泡或溃
烂;十至十二周开始结痴,痴皮脱落后留下一个微红色的小疤
痕,以后红色逐渐变成肤色。

问题8:接种卡介苗后,局部有脓泡或溃烂要如何照护?

答:接种卡介苗后局部有脓泡或溃烂时,不必擦药或包扎。
但局部要保持清洁,衣服不要穿得太紧,如有脓液流出,可用无
菌纱布或棉花拭干,不要挤压,平均约两至三个月自然会愈合结
痴,痴皮要等它自然脱落,不可提早把它剥去。

问题9:接种卡介苗后,引起淋巴腺肿大,经常发生在什么
部位?是什么原因造成的?

答:婴儿接种后,在同侧腋窝偶尔会有淋巴结肿大的现象,
并不要紧,它会自行消失。淋巴结肿大,多在左侧腋下,但偶尔
也有在锁骨下或颈部发生;一般可以在发生部位皮下触摸得到可
移动性的肿大淋巴结;如果已经化脓时,则会与皮肤相连,有时
局部会有化脓白点出现。发生淋巴结肿大的主要原因是与个人体
质有关,接种年龄越小越容易发生,此外与接种疫苗的种类或接
种过深如接种在皮下、注射前未摇匀也有关。

问题10:如果发生淋巴结肿大,怎么办?

答:在接种卡介苗后若无淋巴结肿大,请到结核病防治所就诊,医
生根据需要给予用药,必要时可外科手术治疗。

什么情况不可以接种卡介苗?

答:(1)疑似结核病及疑似结核菌感染的人,应先经结核菌素测
验,确定没有被结核菌感染,才可接种卡介苗。(2)罹患急性病、发烧、

皮肤病、严重湿疹、慢性病及早产儿或体重未

以下之新生儿,都暂时不要接种卡介苗。(3)
天免疫不全的人、HIV感染者绝对不可接种卡
介苗。

问题12:婴儿在医院出生二十四小时
经接种了卡介苗,但未留下任何痕迹
因?如何处理?

答:已经接种卡介苗,但未留下痕迹,
为:(1)纪录错误,已纪录接种其实是遗漏未
到,有时反应是在平均发生反应期间稍后才
误差,如:未注入足量的疫苗。可以在接种
如为反应阴性,则再接种卡介苗一次。

问题13:出生后立即接种卡介苗,
否有差别?

答:卡介苗接种是否成功地引起人工
核质试验变成阳性的比率作为指标。根据
内立即接种,接种后结核菌素测验变成阳性
种为低。但如果出生后太久才接种,又担心存
有毒结核菌的感染。在传染来源很普遍或家
越早接种越好;反之,小宝宝未满月前少有被
被结核菌感染的机会,若出生时在医院没有打
生所接种就可以了。

问题14:如何判断卡介苗已接种成
答:接种3个月后应到结核病防治所或
菌素试验。如果试验阳性,说明接种成功,
试验阴性,则说明接种未成功,还需要重新接

武汉市