



5

咳嗽、咯痰2周以上，应及时到医院诊治。



连续咳嗽、咳痰2周或者痰中带血丝，应怀疑得了肺结核，应及时到结核病防治机构或结核病定点医院就诊。我国在结核病定点医疗机构对肺结核检查、治疗的部分项目实行免费政策。


6

只要坚持规范治疗，绝大多数肺结核是可以治愈的。

一旦确诊为肺结核，要规范服药6—8个月，不能间断或擅自停药。否则，极易复发，甚至引发耐药。一旦变成耐药肺结核，治疗难度加大，时间长达2年，费用是普通结核的数倍。



中国健康教育中心/卫生部新闻宣传中心 编印  
中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心




# 控制结核 人人有责

国家卫生和计划生育委员会



## 1

肺结核是我国发病、死亡人数最多的重大传染病之一。



肺结核俗称“痨病”，是由结核菌侵入肺部引起的呼吸道传染病。肺结核如果不能及时、彻底治疗，会严重危害健康，甚至危及生命，还有可能传染家人和朋友。

## 2

肺结核主要通过咳嗽、打喷嚏传播。



传染性肺结核病人咳嗽、打喷嚏或者大声说话时喷出的飞沫中带有结核菌，会传播给他人。肺结核病人如果把痰吐在地上，痰液干燥后，结核杆菌与尘埃混在一起飞扬在空气中，被健康人吸入肺内也可引起传染。

## 3

勤洗手、多通风、强身健体可以有效预防肺结核。



肺结核属于呼吸道传染病，勤洗手、多通风可以降低与结核菌的接触几率，强身健体可以增强身体抵抗力，降低感染结核菌和患结核病的风险。

咳嗽喷嚏掩口鼻、不随地吐痰可以减少肺结核的传播。

## 4

不随地吐痰，养成良好的卫生习惯。肺结核病人在公共场所要佩戴口罩，咳嗽、打喷嚏时用手帕或纸巾掩住口鼻，避免近距离、面对他人大声说话。

