

2、鼠药及器械灭鼠

市民能在正规鼠药销售点买到的慢性鼠药（一般是溴敌隆谷物毒饵）是较为理想的鼠药，其效果比以前的急性药更好。慢性鼠药对人畜很安全，万一误食或猫狗捕食数个中毒鼠导致二次中毒，可以到医院或宠物医院注射维生素K₁解毒。



稻谷毒饵
慢性（溴敌隆）



慢性（溴敌隆）
颗粒毒饵

鼠药投放在老鼠经常活动、隐蔽、干燥的角落（鼠药受潮易发酶、失效）。一般每15平方米投放2堆药，最好用一次性醋碟或小瓷盘盛放，每堆20克左右。观察补药是鼠药灭鼠成败的关键，3~5天观察一次。观察发现鼠药吃完，则应加倍投放鼠药；没有吃完，则吃多少补多少。无盗食时，则调整投放地点。老鼠不间断取食鼠药效果最好，当取食到一定量时，老鼠会在4~20天亡。



用一次性醋碟或
小瓷盘盛放毒饵



鼠药中毒可用
维生素K₁解毒

3、防鼠措施


灭鼠后需要完善住宅防鼠设施，以免鼠再次进入。居民家中的门窗缝隙不能有小拇指那么大，否则外面的老鼠从缝隙内钻近来。窗户最好钉上金属纱窗。窗户最好不要开，防止老鼠从外面进入。居民家中的空调管、抽油烟机等有空隙的地方用硬物把空隙堵上，厕所下水道使用金属地漏或防臭器，防止老鼠进入。



加盖排风扇



窗上安装铁丝网



用硬物填塞墙孔洞



金属地漏或厕所防臭器

了解更多的灭鼠及除四害知识请上
武汉市疾病预防控制中心网站：www.whcdc.org



灭鼠常识

给社区居民的建议



武汉市爱国卫生运动委员会办公室
武汉市疾病预防控制中心

一、武汉常见老鼠种类

武汉的家居环境中常见的鼠类为：
褐家鼠、黄胸鼠、小家鼠和黑线姬鼠。



褐家鼠（主要生活在城市地面或下水道，传播家鼠型流行性出血热、地方性斑疹伤寒和钩端螺旋体病）



黄胸鼠（主要生活在建筑物的上层、屋顶，传播鼠疫、地方性斑疹伤寒和钩端螺旋体病）



小家鼠（主要生活在农村与城乡结合部，传播家鼠型流行性出血热）



黑线姬鼠（主要分布于农村的野外，传播鼠姬鼠型流行性出血热和钩端螺旋体病）

二、老鼠的习性

老鼠繁殖力强，全年大部分时间都能繁殖，而且胎仔数多。老鼠主要在夜间活动，黄昏和黎明前有两个活动觅食高峰。老鼠善于攀爬、喜欢打洞，而且食性很广，可吃各种谷物、肉类水果、垃圾、动物粪便等。



老鼠喜欢打洞



老鼠善于攀爬

三、老鼠的危害

老鼠在我国传播35种疾病，武汉主要的鼠传疾病为流行性出血热和钩端螺旋体病。老鼠除了能够传播疾病，还能造成农业损失，导致作物生长期的破坏。全世界由于老鼠危害导致贮粮损失5%。老鼠在堤坝上挖掘洞穴破坏农业水利，并可导致决堤。为了磨牙，老鼠咬啮物品、衣物、门窗、电缆。老鼠咬啮导致建筑物和家庭物品的破坏。老鼠还可能咬人，如小孩、病人、残疾人士、熟睡者可能被老鼠咬伤。

四、常用灭鼠方法：

1、改善环境卫生

老鼠进入并驻扎室内的原因往往是您家室内有老鼠的食物和饮水，有老鼠的藏身之处。因此，应该将食物，如米、水果、蔬菜等食品，严密收藏，并同时控制家中的水。把室内杂乱的物品收捡好，消除老鼠藏身的地方。老鼠失去食物、水，且无藏身处，就会离开您家。不控制食物和水，自然就降低鼠药及器械灭鼠的效果，甚至使之失效。